



Guida alla preparazione e
somministrazione del vaccino
COVID-19 mRNA Moderna
per operatori sanitari

Disinfettare con salviette disinfettanti o garza imbevuta di **alcool al 70%** la superficie della fiala e con siringa da 1 ml e ago da 23 o 25 gauge prelevare un **minimo eccesso rispetto a 0,5 ml**

Prima di rimuovere l'ago dalla fiala **eliminare tutte le bolle** ed espellere il medicinale in eccesso, premendo lentamente lo stantuffo in modo che si allinei alla linea che segna **0,5 ml**

Rimuovere ora l'ago dalla fiala

Con il patrocinio di





Guida alla preparazione e
somministrazione del vaccino
COVID-19 mRNA Moderna
per operatori sanitari

Si raccomanda di utilizzare lo **stesso ago** per prelevare e somministrare quando possibile

La dose da somministrare è **0,5 ml**

Non possono essere mescolati residui di fiale diverse di vaccini, seppur con lo stesso lotto e scadenza

Prima della somministrazione **verificare** che la dose sia **0,5 ml** e che il liquido **non abbia alterazioni visibili**

Con il patrocinio di





Guida alla preparazione e
somministrazione del vaccino
COVID-19 mRNA Moderna
per operatori sanitari

Procedere all'**identificazione del paziente**, chiedendo:

“Qual è il suo nome e cognome?”

“Qual è la sua data di nascita?”

Verificare la **corrispondenza** della risposta con quanto riportato nella **documentazione sanitaria** e tessera sanitaria (in caso di omonimia verificare sempre la corrispondenza del codice fiscale)

Con il patrocinio di





Guida alla preparazione e
somministrazione del vaccino
COVID-19 mRNA Moderna
per operatori sanitari

Verificare l'assenza di controindicazioni alla somministrazione, quali:

- Storia di **gravi reazioni allergiche** a qualsiasi **componente del vaccino**
- Grave reazione allergica alla **prima dose del vaccino**
- Età inferiore a **18 anni**
- **Altra vaccinazione** negli ultimi 15 giorni

Con il patrocinio di





Guida alla preparazione e
somministrazione del vaccino
COVID-19 mRNA Moderna
per operatori sanitari

Verificare inoltre la presenza di **situazioni particolari** per le quali è **meglio consultare un medico** prima della somministrazione, come:

- Assunzione di **anticoagulanti**
- Presenza di **sintomi** quali febbre
- Presenza di **immunodepressione** o assunzione di farmaci immunodepressivi
- Stato di **gravidanza/allattamento**

Con il patrocinio di





Guida alla preparazione e
somministrazione del vaccino
COVID-19 mRNA Moderna
per operatori sanitari

L'esperienza relativa all'uso di **COVID-19 Vaccine Moderna** in donne in **gravidanza è limitata** e non è noto se sia escreto nel latte materno

La somministrazione durante la gravidanza e allattamento deve essere presa in considerazione **solo se i potenziali benefici superano gli eventuali potenziali rischi** per la madre e il feto

Con il patrocinio di



Ordine
Professioni
Infermieristiche
LA SPEZIA





Guida alla preparazione e
somministrazione del vaccino
COVID-19 mRNA Moderna
per operatori sanitari

Assicurarsi che il paziente sia a **conoscenza** del fatto che dovrà ricevere una **seconda dose** di vaccino dopo almeno 28 giorni

Somministrare il vaccino per via intramuscolare in sede deltoide

Cambiare i guanti associando l'igiene delle mani ad **ogni somministrazione**

Segnare sulla fiala la **data e ora** di prelievo della prima dose

Con il patrocinio di

